

**Anfibios y Reptiles de la
Zona Protectora Cerros de La Carpintera de Costa Rica.**

Esmeralda Arévalo Huevo
Estudiante de Biología de la Universidad Latina de Costa Rica.
San José 16 de Abril 2009.

Ranas

Smilisca sordida, (Peters, 1863e)



Esta especie se encuentra en el bosque húmedo y lluvioso, en el bosque premontano lluvioso. Del noreste de Honduras hasta el noroeste de Panamá en la vertiente atlántica. En Costa Rica en el suroeste de la vertiente atlántica y en el noroeste de la vertiente del Pacífico. Entre los 2 hasta los 1525 m de altitud.

Craugastor bransfordii, (Cope, 1886)



Se encuentra en zonas bajas húmedas, en el bosque premontano en la vertiente del Atlántico, desde el Este de Nicaragua hasta la parte central de Costa Rica. Va desde los 60 hasta los 880 m de altitud.

Salamandras

Bolitoglossa sp (Taylor, 1949c)



Se encuentra en zonas húmedas del bosque premontano y montano. Va desde los 1,900 hasta los 3,000m de elevación.

Bolitoglossa subpalmata (Boulenger, 1896a)



Esta especie se encuentra en las dos vertientes de La Cordillera de Guanacaste, Cordillera de Tilarán, Cordillera Central en Costa Rica. Va desde los 1,245 hasta los 2,900 m de elevación.

Reptiles

Norops tropidolepis (Boulenger, 1885)



Esta especie se encuentra en las zonas altas de la Cordillera de Tilarán y Cordillera Central y al norte de la Cordillera de Talamanca. Va desde los 1,220 hasta los 2,506 m de altitud.

Notas:

Las especies *Smilisca sordida* y *Craugastor bransfordii* en este caso están por encima de su rango de distribución según el autor del libro *The Amphibians and Reptiles of Costa Rica*, Jay M. Savage, por lo tanto sería prudente hacer mas investigación en la zona para poder aportar más datos.